

対象疾患名(がん腫)	頭頸部がん(術前・術後、進行・再発)
レジメン名	PCE

1クール期間	3週	総クール数			規定なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15					
1クール目									
セツキシマブ	(初回)400 (2回目以降)250 mg/㎡	○	○	○					
パクリタキセル	100 mg/㎡	○	○						
カルボプラチン	5 mg/GFR+25	○	○						
2クール目以後									
セツキシマブ	250 mg/㎡	○	○	○					
パクリタキセル	100 mg/㎡	○	○						
カルボプラチン	5 mg/GFR+25	○	○						

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1クール目					
Rp1	パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミン酸注(5mg/1mL/A) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) ホスネツビタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 1瓶 1管 1管 1瓶	点滴	30分	day1.8
Rp1'	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミン酸注(5mg/1mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	30分	day15
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 100mg/㎡	点滴	60分	day1.8
Rp3	生理食塩液(250mL/B) ◆カルボプラチン注	1袋 2.5mg/GFR+25	点滴	60分	day1.8
Rp4	生理食塩液(250mL/B) ◆セツキシマブ注	1袋 400mg/㎡	点滴	120分	day1
Rp4'	生理食塩液(250mL/B) ◆セツキシマブ注	1袋 250mg/㎡	点滴	60分	day8.15
Rp5	生理食塩液(100mL/V)	1袋	点滴	30分	day1
2クール目以後					
Rp1	パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミン酸注(5mg/1mL/A) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) ホスネツビタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 1瓶 1管 1管 1瓶	点滴	30分	day1.8
Rp1'	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミン酸注(5mg/1mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	30分	day15
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 100mg/㎡	点滴	60分	day1.8
Rp3	生理食塩液(250mL/B) ◆カルボプラチン注	1袋 2.5mg/GFR+25	点滴	60分	day1.8
Rp4	生理食塩液(250mL/B) ◆セツキシマブ注	1袋 250mg/㎡	点滴	60分	day1.8.15
Rp5	生理食塩液(100mL/V)	1袋	点滴	30分	day1.8.15

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

皮膚障害予防セット(抗生物質約6週間内服＋ヘパリン類似物質外用＋顔・体・頭用ステロイド外用)

セツキシマブによる皮膚障害の予防:保湿・保清・保護

パクリタキセルによる末梢神経障害

パクリタキセルにアルコール含有:治療後、車の運転禁止(当日)

パクリタキセルによるアレルギー予防:d-クロルフェニラミン注(内服不可のため)