

対象疾患名(がん腫)	頭頸部がん(術前・術後、進行・再発)
レジメン名	アービタックス+PTX

1クール期間	1週	総クール数	規定なし						
抗癌剤	1日投与量	day1							
初回									
セツキシマブ	400 mg/m ²	○							
パクリタキセル	80 mg/m ²	○							
2回目以後									
セツキシマブ	250 mg/m ²	○							
パクリタキセル	80 mg/m ²	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
初回					
Rp1	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミンマレイン酸注(5mg/1mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆セツキシマブ注	1袋 400mg/m ²	点滴	120分	day1
Rp3	生理食塩液(100mL/V)	1袋	点滴	30分	day1
Rp4	生理食塩液(100mL/V) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A)	1袋 1管	点滴	30分	day1
Rp5	生理食塩液(250mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 80mg/m ²	点滴	60分	day1
2回目以後					
Rp1	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミンマレイン酸注(5mg/1mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆セツキシマブ注	1袋 250mg/m ²	点滴	60分	day1
Rp3	生理食塩液(100mL/V)	1袋	点滴	30分	day1
Rp4	生理食塩液(100mL/V) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A)	1袋 1管	点滴	30分	day1
Rp5	生理食塩液(250mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 80mg/m ²	点滴	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

皮膚障害予防セット(抗生物質約6週間内服+ヘパリン類似物質外用+顔・体・頭用ステロイド外用)

セツキシマブによる皮膚障害の予防:保湿・保清・保護

パクリタキセルによる末梢神経障害

パクリタキセルにアルコール含有:治療後、車の運転禁止(当日)

パクリタキセルによるアレルギー予防:d-クロルフェニラミン注(内服不可のため)