

対象疾患名(がん腫)	【子宮体がん】
レジメン名	【3週毎】PEMBRO＋Lenvatinib 【6週毎】PEMBRO＋Lenvatinib

1クール期間	3週間、6週間	総クール数	規定なし
抗癌剤	1日投与量	day1	
ペムブロリズマブ	200 or 400 mg/body	○	

投与スケジュール

ルートキープ <sup>o</sup> 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/B) ◆ペムブロリズマブ注	1袋 200 or 400mg/body	点滴	30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
レンバチニブ	20mg	1日1回	連日

注意事項

irAEの早期発見: 血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渴・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。

レンバチニブによる高血圧管理: 家庭血圧の測定・記録を推奨

レンバチニブによる手足症候群の予防: 保湿・保清・保護・刺激を避ける

予防として尿素配合外用剤やヘパリン類似物質配合の外用剤を使用

レンバチニブ: 高血圧、手足症候群、甲状腺機能低下症、疲労、食欲減退・下痢、創傷治癒遅延、出血など