

対象疾患名(がん腫)	非小細胞肺癌(進行・再発)
レジメン名	PEM+ペムブロリズマブ

1クール期間	3週間	総クール数	規定なし
抗癌剤	1日投与量	day1	
ペムブロリズマブ	200 mg/body	○	
ペトレキセド	500 mg/m ²	○	

投与スケジュール

ルートキー ^o 生理食塩液100ml					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/B) ◆ペムブロリズマブ注	1袋 200mg/body	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(50mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	15分	day1
Rp3	生理食塩液(100mL/V) ◆ペトレキセド注	1袋 500mg/m ²	点滴	10分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項1

irAEの早期発見: 血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渴・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。

ペトレキセド^o: 葉酸を開始7日前以前～終了後22日目まで(1日1回0.5mg)内服

ビタミンB12[1mg](メコバル)を少なくとも開始7日前に筋肉注射、その後9週ごと・終了後22日目まで投与

NSAIDs禁