

対象疾患名(がん腫)	卵巣がん(進行・再発)
レジメン名	PLD+BEV

1クール期間	4週間	総クール数			制限なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day15						
リポソーマル ドキシソルビシン	40 mg/m ²	○							
ベバシズマブ	10 mg/kg	○	○						

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL						
順番 day1	順番 day15	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1		生理食塩液(50mL/V) デキサメタゾン注射液 (6.6mg/2mL/V)	1瓶 1瓶	点滴	15分	day1
Rp2		5%ブドウ糖ソフトバッグ (250mL/B) ◆トキシル注	1袋 40mg/m ²	点滴	90分	day1
Rp3		生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	15分	day1
Rp4	Rp1	生理食塩液(100mL/V) ◆ベバシズマブ注	1瓶 10mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1、15

注意事項

手足症候群の予防:保湿・保清・保護

口内炎の予防:齲歯・歯肉炎などの治療(定期的な歯科受診)ブラッシング・うがいなどによる口内の清潔化

ベバシズマブによる高血圧管理:家庭血圧の測定・記録を推奨

ベバシズマブ:出血、創傷治癒遅延、高血圧など。抜歯、手術は間隔をあける