

対象疾患名(がん腫)	卵巣がん(進行・再発)
レジメン名	PLD+BEV

1クール期間	4週間	総クール数				制限なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day15						
リホ <sup>®</sup> ソーマルト <sup>®</sup> キソルピ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン	40 mg/m <sup>2</sup>	○							
ベバシズマブ <sup>®</sup>	10 mg/kg	○	○						

#### 投与スケジュール

ルートキープ <sup>®</sup> 生理食塩液100mL						
順番 day1	順番 day15	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1		生理食塩液(50mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1瓶 1瓶	点滴	15分	day1
Rp2		5%ブドウ糖ソフトパック <sup>®</sup> (250mL/B) ◆トキシ <sup>®</sup> ル注	1袋 40mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1
Rp3		生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	15分	day1
Rp4	Rp1	生理食塩液(100mL/V) ◆ベバシズマブ <sup>®</sup> 注	1瓶 10mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1、15

#### 内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

#### 注意事項

手足症候群の予防: 保湿・保清・保護

口内炎の予防: 齲歯・歯肉炎などの治療(定期的な歯科受診)、ブラッシング・うがいなどによる口内の清潔化

ベバシズマブによる高血圧管理: 家庭血圧の測定・記録を推奨