

対象疾患名(がん腫)	婦人科がん(術前・術後補助、進行・再発)
レジメン名	TC療法(PTX175+CBDCA AUC5)

1クール期間	4週間	総クール数	術前・術後補助:3~6クール 進行・再発:制限なし						
抗癌剤	1日投与量	day1							
パクリタキセル	175 mg/m ²	○							
カルボプラチン	5 mg/GFR+25	○							

投与スケジュール

ルートキーフ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	パロセトロン点滴静注液バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 1瓶 1管 1瓶	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液ソフトバッグ(500mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 175mg/m ²	点滴	180分	day1
Rp3	生理食塩液ソフトバッグ(250mL/B) ◆カルボプラチン注	1袋 5mg/GFR+25	点滴	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ジフェンヒドラミン	5錠	PTXの 開始30分前	day1

注意事項

吐き気予防対策:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

パクリタキセルによるアレルギー予防:点滴前の投薬としてジフェンヒドラミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有:治療後、車の運転禁止(当日)