

対象疾患名(がん腫)	婦人科がん(術前・術後補助、進行・再発)
レジメン名	TC療法 (PTX175+CBDCA AUC5)

1クール期間	4週間	総クール数	術前・術後補助: 3~6クール 進行・再発: 制限なし						
抗癌剤	1日投与量	day1							
パクリタキセル	175 mg/m ²	○							
カルボプラチン	5 mg/GFR+25	○							

投与スケジュール

ルートキープ KN3号輸液(500mL/B)					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	パロセトン点滴静注液バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	15分	day1
Rp2	生理食塩液ソフトバッグ(500mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 175mg/m ²	点滴	180分	day1
Rp3	生理食塩液ソフトバッグ(500mL/B) ◆カルボプラチン注	1袋 5mg/GFR+25	点滴	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ジフェンヒドラミン	5錠	PTXの 開始30分前	day1

注意事項

吐き気予防: アプレピタント+デキサメタゾンの服用

パクリタキセルによるアレルギー予防: 点滴前の投薬としてジフェンヒドラミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有: 治療後、車の運転禁止(当日)