

対象疾患名(がん腫)	婦人科がん(進行・再発)
レジメン名	TC療法(PTX175+CBDCA AUC5) + BEV

1クール期間	3週間	総クール数	6~8クール						
抗癌剤	1日投与量	day1							
パクリタキセル	175 mg/m ²	○							
カルボプラチン	5 mg/GFR+25	○							
ベバシズマブ	15 mg/kg	○							

投与スケジュール

ルートキーフ		生理食塩液100mL							
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日				
Rp1	ハロセトン点滴静注液バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 1瓶 1管 1瓶	点滴	30分	day1				
Rp2	生理食塩液ソフトバッグ(500mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 175mg/m ²	点滴	180分	day1				
Rp3	生理食塩液ソフトバッグ(250mL/B) ◆カルボプラチン注	1袋 5mg/GFR+25	点滴	60分	day1				
Rp4	生理食塩液(100mL/V)	1瓶	点滴	15分	day1				
Rp5	生理食塩液(100mL/V) ◆ベバシズマブ注	1瓶 15mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1				

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ジフェンヒドรามミン	5錠	PTXの開始30分前	day1

注意事項

吐き気予防対策:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

パクリタキセルによるアレルギー予防:点滴前の投薬としてジフェンヒドรามミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有:治療後、車の運転禁止(当日)

ベバシズマブによる高血圧管理:家庭血圧の測定・記録を推奨