

対象疾患名(がん腫)	婦人科がん(進行・再発)
レジメン名	TC療法(PTX175+CBDCA AUC5) + BEV

1クール期間	3週間	総クール数	6~8クール
抗癌剤	1日投与量	day1	
パクリタキセル	175 mg/m ²	○	
カルボプラチン	5 mg/GFR+25	○	
ベバシズマブ	15 mg/kg	○	

投与スケジュール

ルート	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ルートキープ	生理食塩液100mL				
Rp1	パロセトロン点滴静注液バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	15分	day1
Rp2	生理食塩液ソフトバッグ(500mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 175mg/m ²	点滴	180分	day1
Rp3	生理食塩液ソフトバッグ(500mL/B) ◆カルボプラチン注	1袋 5mg/GFR+25	点滴	60分	day1
Rp4	生理食塩液(100mL/V)	1瓶	点滴	15分	day1
Rp5	生理食塩液(100mL/V) ◆ベバシズマブ注	1瓶 15mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ジフェンヒドラミン	5錠	PTXの 開始30分前	day1

注意事項

吐き気予防: アプレピタント+デキサメタゾンの服用

パクリタキセルによるアレルギー予防: 点滴前の投薬としてジフェンヒドラミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有: 治療後、車の運転禁止(当日)

ベバシズマブによる高血圧管理: 家庭血圧の測定・記録を推奨