

対象疾患名(がん腫)	胃がん(進行・再発)二次治療以後
レジメン名	RAM+wPTX

1クール期間	4週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15					
ラムシルマブ	8 mg/kg	○		○					
パクリタキセル	80 mg/m ²	○	○	○					

投与スケジュール

ルートキープ ^o 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/V) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1瓶 1管 1管	点滴	30分	day1.8.15
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆ラムシルマブ注	1瓶 8mg/kg	点滴	初回60分 2回目以降 30分	day1.15
Rp2	生理食塩液(100mL/V)	1瓶	点滴	15-30分	day1.15
Rp3	生理食塩液(250mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 80mg/m ²	点滴	60分	day1.8.15

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ジフェンヒドラミン(PTX投与時のみ)	50mg	開始30分前	day1.8.15

注意事項

パクリタキセルによるアレルギー予防:点滴前に服用するためにジフェンヒドラミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有:治療後、車の運転禁止(当日)

ラムシルマブによる高血圧管理:家庭血圧の測定・記録を推奨

ラムシルマブ:出血、創傷治癒遅延、高血圧など。抜歯、手術は間隔をあける