

| | |
|------------|------------------|
| 対象疾患名(がん腫) | 胃がん(進行・再発、術前、導入) |
| レジメン名 | SOX100 SOX130 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|-------|------|-----|-------|------|--|--|--|
| 1クール期間 | 3週間 | 総クール数 | | | | 規定なし | | | |
| 抗癌剤 | 1日投与量 | day1 | day2 | ... | day14 | | | | |
| オキサリプラチン | 100 or 130 mg/m ² | ○ | | | | | | | |
| S1(内服) | 下記記載あり | ○ | ○ | ... | ○ | | | | |

投与スケジュール

| ルートキープ [°] 生理食塩液100mL | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|------|------|------|
| 順番 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| Rp1 | ハロ/セロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) | 1袋 1瓶 | 点滴 | 30分 | day1 |
| Rp2 | 5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆オキサリプラチン注 | 1袋 100 or 130mg/ m ² | 点滴 | 120分 | day1 |

内服

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|-------------------|-------|-------|---------|
| エスワン配合錠 20mg・25mg | 下記参照 | 朝・夕食後 | day1～14 |

※体表面积 1.25m²未満 40mg/回(80mg/日)
1.25以上～1.5m²未満 50mg/回(100mg/日)
1.5m²以上 60mg/回(120mg/日)
腎機能による減量規定あり

注意事項1

吐き気予防: アプレピタント(+デキサメタゾン)の服用

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防: 点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避

S1による流涙の予防: 人工涙液(防腐剤なし)の購入および使用を推奨

服薬日誌の利用を推奨