

対象疾患名(がん腫)	胃がん(進行・再発、術前、導入)
レジメン名	SOX(100or130)+Pembro

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14				
ペムブロリズマブ	200 mg/body	○							
オキサリプラチン	100 or 130 mg/m ²	○							
S1(内服)	下記記載あり	○	○	...	○				

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/B) ◆ペムブロリズマブ注	1袋 200mg/body	点滴	30分	day1
Rp2	パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 4.95mg 1瓶	点滴	30分	day1
Rp3	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆オキサリプラチン注	1袋 100 or 130mg/m ²	点滴	120分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
エスワン配合錠 20mg・25mg	下記参照*	朝・夕食後	day1~14

* 体表面積 1.25m²未満 40mg/回(80mg/日)
1.25以上~1.5m²未満 50mg/回(100mg/日)
1.5m²未満 60mg/回(120mg/日)
腎機能による減量規定あり

注意事項

吐き気予防:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防:点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避

S1による流涙の予防:人工涙液(防腐剤なし)の購入および使用を推奨

irAEの早期発見:血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渴・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院を受診する。

服薬日誌の利用を推奨