

| | |
|------------|--------------|
| 対象疾患名(がん腫) | 子宮頸がん(進行・再発) |
| レジメン名 | TC+PEMBRO |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| 1クール期間 | 3週間 | 総クール数 | 制限なし | | | | | | |
| 抗癌剤 | 1日投与量 | day1 | | | | | | | |
| ペムブロリズマブ | 200 mg/body | ○ | | | | | | | |
| パクリタキセル | 175 mg/m ² | ○ | | | | | | | |
| カルボプラチン | 5 mg/GFR+25 | ○ | | | | | | | |

投与スケジュール

| ルートキープ 生理食塩液100mL | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|------|------|------|
| 順番 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| Rp1 | 生理食塩液(100mL/B) ◆ペムブロリズマブ注 | 1袋 200mg/body | 点滴 | 30分 | day1 |
| Rp1 | パロセトン点滴静注液バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) | 1袋 1瓶 1管 1瓶 | 点滴 | 30分 | day1 |
| Rp2 | 生理食塩液ソフトバッグ(500mL/B) ◆パクリタキセル注 | 1袋 175mg/m ² | 点滴 | 180分 | day1 |
| Rp3 | 生理食塩液ソフトバッグ(250mL/B) ◆カルボプラチン注 | 1袋 5mg/GFR+25 | 点滴 | 60分 | day1 |
| Rp4 | 生理食塩液(100mL/B) | 1袋 | 点滴 | 15分 | day1 |

内服

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|-----------|-------|----------------|------|
| ジフェンヒドラミン | 50mg | PTX開始の 30分前 | day1 |

注意事項

吐き気予防対策: デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

パクリタキセルによるアレルギー予防: 点滴前に服用するためにジフェンヒドラミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有: 治療後、車の運転禁止(当日)

パクリタキセルによる末梢神経障害

irAEの早期発見: 血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渇・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。