

対象疾患名(がん腫)	胃がん(進行・再発、術前、導入)
レジメン名	Tmab+CapeOX

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14				
トラスツズマブ	(初回)8 (2回目以降)6 mg/kg	○							
オキサリプラチン	130 mg/m ²	○							
カペシタビン(内服)	下記記載あり	○	○	...	○				

投与スケジュール

ルートキー ^① 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆トラスツズマブ注 注射用水(20mL/A)	1瓶 (初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg 1瓶	点滴	初回90分 2回目以降 30分	day1
Rp2	パロ/セトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 4.95mg 1瓶	点滴	30分	day1
Rp3	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆オキサリプラチン注	1袋 130mg/m ²	点滴	120分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
カペシタビン300mg	下記参照*	朝・夕食後(30分 以内に服用)	day1~14

* 1.36m²未満 : 1200mg/回(2400mg/日)
1.36m²以上1.66m²未満 : 1500mg/回(3000mg/日)
1.66m²以上1.96m²未満 : 1800mg/回(3600mg/日)
1.96m²以上 : 2100mg/回(4200mg/日)

注意事項1

吐き気予防: デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防: 点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避

カペシタビンによる手足症候群の予防: 保湿

トラスツズマブによる心機能の低下: 労作時息切れ、体重増加(浮腫)などに注意

服薬日誌の利用を推奨