

対象疾患名(がん腫)	胃がん(進行・再発、術前、導入)
レジメン名	Tmab+SOX(100 or 130)

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14				
トラスツズマブ	(初回)8 (2回目以降)6 mg/kg	○							
オキサリプラチン	100 or 130 mg/m <sup>2</sup>	○							
S1(内服)	下記記載あり	○	○	...	○				

### 投与スケジュール

ルートキーブ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆トラスツズマブ注 注射用水(20mL/A)	1瓶 (初回)8mg/kg (2回目以降) 6mg/kg 1瓶	点滴	初回90分 2回目以降30分	day1
Rp2	パロ/セトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 4.95mg 1瓶	点滴	30分	day1
Rp3	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆オキサリプラチン注	1袋 100 or 130mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	day1

### 内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
エスワン配合錠 20mg・25mg	下記参照*	朝・夕食後	day1~14

\* 体表面積 1.25m<sup>2</sup>未満 40mg/回(80mg/日)  
1.25以上~1.5m<sup>2</sup>未満 50mg/回(100mg/日)  
1.5m<sup>2</sup>未満 60mg/回(120mg/日)  
腎機能による減量規定あり

### 注意事項1

吐き気予防:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防:点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避

S1による流涙の予防:人工涙液(防腐剤なし)の購入および使用を推奨

トラスツズマブによる心機能の低下:労作時の息切れや浮腫(体重増加)などに注意

服薬日誌の利用を推奨