

対象疾患名(がん腫)	尿路上皮がん(進行・再発)
レジメン名	EV+PEMBRO

1クール期間	3週間	総クール数				制限無し			
抗癌剤	1日投与量	day1	day8						
エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	○	○						
ペムブロリズマブ	200 mg/body	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(50mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1瓶 1瓶	点滴	15分	day1、8
Rp2	生理食塩液(100mL/B) ◆エンホルツマブ ベドチン注 注射用水(20mL/A)	1瓶 1.25mg/kg 1管	点滴	30分	day1、8
Rp3	生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	15分	day1
Rp4	生理食塩液(100mL/B) ◆ペムブロリズマブ注	1瓶 200mg/body	点滴	30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

エンホルツマブ ベドチンによる皮膚障害・角膜障害・高血糖に注意

エンホルツマブ ベドチンによる高血糖に注意

irAEの早期発見: 血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渇・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。