

| | |
|------------|--------------|
| 対象疾患名(がん腫) | 腎細胞がん(進行・再発) |
| レジメン名 | ニボルマブ |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| 1クール期間 | 2週間(4週間) | 総クール数 | 制限無し | | | | | | |
| 抗癌剤 | 1日投与量 | day1 | | | | | | | |
| ニボルマブ | 240(480) mg/body | ○ | | | | | | | |

投与スケジュール

| ルートキープ 生理食塩液100mL | | | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| 順番 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| Rp1 | 生理食塩液(100mL/B) ◆ニボルマブ注 | 1瓶 240mg/body (480mg/body) | 点滴 | 30分 | day1 |

内服

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|-----|-------|------|-----|
| | | | |

注意事項

irAEの早期発見: 血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渇・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候ががあれば市立豊中病院に受診する。