

| | |
|------------|---------------------|
| 対象疾患名(がん腫) | 婦人科がん(進行・再発) |
| レジメン名 | WeeklyTC(60mg AUC2) |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| 1クール期間 | 1週間 | 総クール数 | 制限なし | | | | | | |
| 抗癌剤 | 1日投与量 | day1 | | | | | | | |
| パクリタキセル | 60 mg/m ² | ○ | | | | | | | |
| カルボプラチン | 2 mg/GFR+25 | ○ | | | | | | | |

投与スケジュール

| ルートキーブ KN3号輸液(500mL/B) | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------|------|------|
| 順番 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| Rp1 | パロノセロン点滴静注液バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) | 1瓶 1瓶 1管 | 点滴 | 15分 | day1 |
| Rp2 | 生理食塩液ソフトバッグ(250mL/B) ◆パクリタキセル注 | 1袋 60mg/m ² | 点滴 | 60分 | day1 |
| Rp3 | 生理食塩液ソフトバッグ(250mL/B) ◆カルボプラチン注 | 1袋 2mg/GFR+25 | 点滴 | 60分 | day1 |

内服

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|-----------|-------|----------------|-----------|
| ジフェンヒドラミン | 5錠 | PTXの 開始30分前 | day1,8,15 |

注意事項

吐き気予防:アプレピタント+デキサメタゾンの服用

パクリタキセルによるアレルギー予防:点滴前の投薬としてジフェンヒドラミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有:治療後、車の運転禁止(当日)