

対象疾患名(がん腫)	胃がん(進行・再発、術前、導入)
レジメン名	XELOX130

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14				
オキサリプラチン	130 mg/㎡	○							
カペシタビン(内服)	下記記載あり mg/㎡	○	○	...	○				

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	ハロノセロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	30分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆オキサリプラチン柱	1袋 130mg/㎡	点滴	120分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
カペシタビン300mg	下記参照	朝・夕食後(30分以内に服用)	day1~14

※1.36㎡未満 : 1200mg/回(2400mg/日)
1.36㎡以上1.66㎡未満 : 1500mg/回(3000mg/日)
1.66㎡以上1.96㎡未満 : 1800mg/回(3600mg/日)
1.96㎡以上 : 2100mg/回(4200mg/日)

注意事項1

吐き気予防: アプレピタント(+デキサメタゾン)の服用

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防: 点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避

カペシタビンによる手足症候群の予防: 保湿

服薬日誌の利用を推奨