

対象疾患名(がん腫)	胃がん(進行・再発、術前、導入)
レジメン名	m-FOLFOX6

1クール期間	2週	総クール数	再発・進行:規定なし						
抗癌剤	1日投与量	day1							
オキサリプラチン	85 mg/m ²	○							
レボホリナート	200 mg/m ²	○							
5FU(急速)	400 mg/m ²	○							
5FU(シュアビューサー)	2400 mg/m ²	○(46時間持続)							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	ハロ/セロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	30分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液ソフトバッグ(250mL/B) ◆オキサリプラチン注	1袋 85mg/m ²	点滴	2時間	day1
Rp2'	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆レボホリナート注	1袋 200mg/m ²	点滴	2時間	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V) ◆フルオウラシル注	1瓶 400mg/m ²	点滴	全開	day1
Rp4	(全量100mLに調整) 生理食塩液(100mL/V) ヘパリンナトリウム注N(1万単位/10mL/V) ◆フルオウラシル注	1瓶 1mL 2400mg/m ²	静脈内局所持 続注入(シュア ビューサー)	約46時間 (2mL/H)	day1(~3)

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項1

吐き気予防:デキサメタゾン+(アプレピタント)の服用

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防:点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避