

対象疾患名(がん腫)	乳がん(術後補助・進行・再発)
レジメン名	トラスツズマブ+ペルツズマブ

1クール期間	3週間	総クール数			規定なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15					
初回									
ペルツズマブ	840 mg/body	○							
トラスツズマブ	8 mg/kg	○							
2回目以後									
ペルツズマブ	420 mg/body	○							
トラスツズマブ	6 mg/kg	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
初回					
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆ペルツズマブ注	1袋 840mg/body	点滴	60分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆トラスツズマブ注 注射用水(20mL/A)	1瓶 8mg/kg 2瓶	点滴	90分	day1
2回目以後					
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆ペルツズマブ注	1袋 420mg/body	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆トラスツズマブ注 注射用水(20mL/A)	1瓶 6mg/kg 1瓶	点滴	30分	day1
ペルツズマブのみ初回(トラスツズマブは2回目以後)					
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆ペルツズマブ注	1袋 840mg/body	点滴	60分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆トラスツズマブ注 注射用水(20mL/A)	1瓶 6mg/kg 1瓶	点滴	30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項1

トラスツズマブによる心機能の低下: 労作時息切れ、体重増加(浮腫)などに注意

ペルツズマブによる下痢に注意

分子標的薬関連皮疹

初回のみ: インフュージョンリアクション予防にアセトアミノフェン内服