

セアカゴケグモにご注意!!

見つけたら 素手で **つかまない!** **さわらない!**



豊中市保健所衛生管理課

出典：大阪府健康医療部環境衛生課

も く じ

セアカゴケグモについて

セアカゴケグモはこんな所にいる!! **住宅編**

セアカゴケグモはこんな所にいる!! **公園編**

自宅（施設）の周りの確認と駆除をするには

もしもセアカゴケグモに咬まれたら…


セアカゴケグモ について

- 出身はオーストラリアやニュージーランド等で暖かいところが大好きです。
寒いところは苦手です。
- 強い毒性をもっていますが、攻撃性はなく、おとなしいクモです。
- 寿命は、ほぼ1年といわれています。

- メスの体長は1cm程度、全体に黒く背に赤色の帯状の模様があるのが特徴です。



実物大



- オスの体長は小さく3mm程度、特徴的な赤い模様がなく、白っぽく見えます。



実物大



- メスは、卵のうという袋に卵を産みます。
- 1回あたりの産卵で卵のう3～5個(500匹ほど)産まれます。

卵のう



セアカゴケグモ はこんな所にいる!!

住宅編

植木鉢の持ち手や裏・受け皿

外置きのサンダル

2階のふとん

自動車の
タイヤ周りや
バンパーの裏

犬小屋

外置きの
サンダル

グレーチングの裏

使っていない
自転車

雨水マスや
段差をなくす鉄板の裏

プランターの持ち手や裏

室外機周辺

低木の下



危険



特に注意



注意



噛まれる
危険性が高い

生息数



特に東・南側の日当りのいいところは注意



豊中市

セアカゴケグモ はこんな所にいる!!

公園編



自宅(施設)の周りの 確認と駆除をするには

準備物




厚手の手袋(軍手など)



ゴキブリ用殺虫スプレー
(ヒレスロイド系)

成虫に噴射します。
(卵のうには効きません。)



針金・さいばしなど

見つけ方

クモの巣で見分けましょう。

セアカゴケグモの巣



- ・落ち葉などを付けた不規則な巣
- ・地面近くにあり、かたく粘りけの強い糸

在来のクモの巣



- ・糸だけのきれいな網状の巣
- ・空中にあり、やわらかい糸

駆除作業の方法



ゴキブリ用殺虫スプレーを巣全体に吹きかけます。



セアカゴケグモが飛び出したら、ゴキブリ用殺虫スプレーを吹きかけるか、弱ったのを確認してふみ潰します。



針金などで巣を取り出します。




卵のう(卵の入った袋)をふみ潰します。


2～3週間後(生き残った子グモが大きくなった頃)に、駆除したところを再確認しましょう。

もしも **セアカゴケグモ** に咬まれたら…

咬まれた時の処置




セアカゴケグモに咬まれたら…



傷口を流水で洗い、患部を冷やします。包帯や止血帯はしないほうがよいでしょう。



ゴキブリ用殺虫スプレーでセアカゴケグモを殺します。
病院には、咬まれたクモを殺して持参した方が適切な治療につながります。



患部を冷やしながら、直ちに病院に行きましょう。

咬まれた時の症状

- ・咬まれると、はじめはチクリと針で刺したような痛みを感じます。（すぐに痛みを感じないこともあります。）
- ・やがて咬まれた部分のまわりが腫れて赤くなります。痛みは次第に全身に広がることもあります。
- ・悪化すると、多量の汗をかいたり、さむけ、吐き気などが現れることもあります。
- ・通常は、数日から数ヶ月で回復する例が多く、咬まれても重症になることはほとんどありません。

お問い合わせ先

豊中市保健所衛生管理課
豊中市中桜塚4丁目11-1
TEL 06-6152-7321

