

トコジラミ

対策

トコジラミは、戦後の殺虫剤の普及や生活環境の改善により、昭和後期にはほとんど目にする事はなくなりましたが、近年、旅行者の増加とともに被害が急増しています。近年蔓延しているトコジラミのほとんどは、ピレスロイド系や有機リン系の既存の殺虫成分が効かない薬剤に抵抗性を持った薬剤抵抗性トコジラミ(以下、スーパートコジラミ)であるため、被害が拡大しています。被害にあわないために、トコジラミについてしっかり学びましょう。

トコジラミとは

大きさ：2mm～8mm程度

色：卵は乳白色


幼体は乳白色～薄い褐色

成体は薄い褐色～濃い褐色



- 幼虫～成虫まで吸血する。
- 夜間に吸血するために活動する。
- 1日で3～6個の卵を産み、繁殖力が高い。
- 鞆や服に取り付いて移動し生息範囲を広げる。
- 血の混じった糞(血糞)をします。

トコジラミの血糞



トコジラミの卵



トコジラミの幼虫



孵化幼虫

孵化幼虫

吸血後

トコジラミの成虫



トコジラミの幼虫



中齢幼虫


写真提供：アース製薬株式会社

トコジラミの潜み場所と見つけ方


- 明かりを点けてトコジラミの姿や卵、血糞がないか確認しましょう。白っぽい場所では血糞を、黒っぽい場所では卵を探すと見つけやすいです。
- 映画館やプラネタリウム、サウナなどの一年中暖かくて暗い場所や、公共交通機関の座席などにもトコジラミがいることがあるので、自宅に持ち帰らないよう注意しましょう。

【確認する場所】

洋室



和室



宿泊施設を経営されている方々へ

トコジラミは繁殖力が高いため、早期発見が重要です。日頃から客室のすみずみまで目視点検を行うことや、整理整頓清掃を徹底しておきましょう。



早期発見のために必要なこと

- 従業員教育
 - ・ トコジラミの生態を理解
 - ・ 清掃時確認の徹底（表面の「トコジラミの潜み場所と見つけ方」を参考に）
- 担当者による定期点検と記録



<見つけた場合の対処方法>

- ・ 部屋から何も持ち出さない、持ち込まない。
 - ・ 発生した客室に近い客室にも広がっている恐れがあるので、すぐに確認する。
 - ・ **スーパートコジラミ（抵抗性トコジラミ※1）にも効果がある成分（プロフラニド、メトキサジアゾン、プロポクスル等）を含む薬剤を使用して駆除する※1。**
- 必要に応じて専門業者に調査・駆除を依頼してください。



※1 ピレスロイド系の薬剤に抵抗性を持つトコジラミが発生している場合は、ピレスロイド系の有効成分を用いたくん煙剤やスプレーなどを使用すると、効果がないだけでなく、トコジラミが興奮して、他の客室に移動するなど、更なる被害拡大を招くことがあります。

トコジラミの被害にあわないために～旅先や自宅できる対策～

- ・ トコジラミは夜行性なので、明かりを点けたまま寝ると被害にあいにくくなります。
- ・ 寝る前に市販の虫除け剤を肌に塗っておくと、刺されるのを防ぐことができます。
- ・ 旅先から帰ってきたら、鞆やスーツケース、衣服についていないか念入りに確認しましょう。
- ・ もし、トコジラミが付着していた場合は、室内に持ち込む前に粘着テープで取り除きましょう。**抵抗性トコジラミにも有効な薬剤**を荷物ごと部屋全体に処理すると、トコジラミを持ち帰ってきたとしても自宅での繁殖を防ぐことができます。
- ・ 着ていた衣類や洗濯物は直接洗濯機に入れ、すぐに洗濯し、衣類乾燥機※2にかけます。
- ・ 旅行先でトコジラミを付着させないために、旅行前に**抵抗性トコジラミにも有効な薬剤**を荷物にふきかけておく等も効果的です。



※2 トコジラミは100℃で数秒、79℃で5分、60℃で10分以上の加熱で死滅します。乾燥機には低温のものもあるので、取扱説明書で温度を確認してください。

相談はこちら

豊中市保健所

<参考>アース製薬株式会社HP

(アース害虫なるほど知恵袋)

(お問合せ先)
豊中市 健康医療部 保健安全課生活衛生係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号
TEL(06)-6152-7321 FAX(06)-6152-7328

https://www.earth.jp/gaichu/wisdom/sonota/article_011.html



豊中市



アース製薬

— アース製薬株式会社は、豊中SDGsパートナーです —

